



W związku ze zmieniającą się sytuacją epizootyczną w Polsce w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz rzekomego pomoru drobiu (ND) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku przypomina, że:

1. są to choroby **wysoce zjadliwe**,
2. wirusy charakteryzują się **dużą przeżywalnością** w środowisku i szybkim rozprzestrzenianiem się,
3. **podatne** jest na nie ptactwo gospodarskie, domowe i dzikie,
4. główne bezpośrednie **drogi transmisji** wirusów to przemieszczenia zakażonych ptaków oraz kontakt z ich wydzielinami i wydaliniami,
5. pośrednio **wirusy przenoszą się** za pośrednictwem skażonej wody, paszy, sprzętu, odzieży, środków transportu,
6. wirusy **inaktywować** można przy zastosowaniu środków do dezynfekcji (np. formalina, podchloryn sodu, alkohol etylowy).

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia powyższych chorób u drobiu w chowie przyzagrodowym należy przestrzegać zasad:

Zakupu drobiu z obszarów wolnych od występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz rzekomego pomoru drobiu (ND) i jedynie z zakładów drobiu będących pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

- karmienia i pojenia drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
- przetrzymywania drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
- odizolowania od innego drobiu, kaczek i gęsi;
- przechowywania paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;



- unikania pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- przed i po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycia rąk wodą z mydłem;
- używania odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osoby utrzymujące drób w chowie przyzagrodowym, nie powinny być zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu oraz świadczyć usług jako „łapacze” podczas przebiórek na fermach brojlerów;
- **dotatkowo, przy prowadzeniu działalności polegającej na sprzedaży jaj w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego czy Sprzedaży Bezpośredniej, należy stosować obowiązkowe szczepienia stada przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (ND),**
- w przypadku pozyskiwania jaj **wyłącznie na własny domowy użytek** szczepienia przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (ND) nie są obowiązkowe, lecz zalecane w celu ochrony stada przed chorobą.

W przypadku zaobserwowania u utrzymywanego ptactwa wymienionych poniżej objawów, należy bezzwłocznie zgłosić to Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Lęborku:

1. nagłe padnięcia bez wcześniejszych objawów,
2. spadek nieśności, brak apetytu, apatia, duszność, sinica,
3. obrzęki głowy, grzebienia, dzwonków,
4. wybroczyny, biegunka, objawy nerwowe (skręty szyi, paraliż skrzydeł i kończyn dolnych)
5. sapanie, kaszel, kichanie, rzężenie, drżenie mięśni,
6. nieprawidłowości w budowie jaj.

W przypadku zamiaru zakupu drobiu do dalszego chowu, w tym kur niosek czy brojlerów, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności. Ostrożność wskazana jest zwłaszcza w sytuacji zakupu drobiu z handlu bezpośredniego np. na targowiskach czy z wykorzystaniem platform internetowych. Jej brak może skutkować nabyciem ptaków zakażonych.

Wobec docierających sygnałów dotyczących obrotu z naruszeniem prawa weterynaryjnego prosimy o zgłaszanie przypadków podejrzanego handlu drobiem do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku.